

ZBIERKA  **ZÁKONOV**
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2000

Vyhlásené: 22.12.2000

Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2009

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

450

ZÁKON

z 30. novembra 2000,

**ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v
znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších
predpisov**

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. a zákona č. 155/1999 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 okrem § 86 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

**„Príloha č. 1
k zákonu č. 450/2000 Z.z.**

PRILOHA č.4

Miera funkčnej poruchy podľa druhov zdravotných postihnutí

I. Infekčné a parazitárne choroby

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1. Tuberkulóza	
1.1. dýchacích ústrojov	
a) počas aktivity ochorenia	40
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami	50-70
1.2. iných orgánov a systémov	
a) počas aktivity ochorenia	40
b) počas aktivity ochorenia s funkčným obmedzením stredného až ťažkého stupňa s komplikáciami	50-70
2. Infekčné a parazitárne choroby s následkami	
2.1. ľahké poruchy funkcie niektorých orgánov a systémov,	10-20
2.2. stredne ťažké formy s recidívou alebo trvalé aktívne so znížením výkonnosti funkcie orgánu	30-40
2.3. ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, chronické stavy s ťažkou poruchou funkcie orgánu a s ťažkým obmedzením výkonnosti	50-70
3. AIDS	
3.1. zistenie HIV-infekcie bez klinických príznakov	0
3.2. syndróm lymfadenopatie	
a) ľahká alterácia celkového stavu	30
b) stredne ťažká alterácia celkového stavu a výkonnosti	50-60
c) ťažká alterácia celkového stavu (rozvinutie choroby, terminálna fáza, ťažké infekčné komplikácie)	80-100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa funkčného postihnutia chorého orgánu a celkového stavu organizmu.

II. Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)	

	a) mierne prejavy	0-10	
	b) stredne ťažké prejavy	20-40	
	c) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti)	50-80	
2. Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania			
	a) ľahká forma	10-20	
	b) stredne ťažká forma (s občasným krvácaním do kĺbov)	30-50	
	c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami)	70-90	
3. Strata sleziny			
	a) u detí do 15 rokov (bez krvného ochorenia)	20	
	b) u dospelých	10	
4. Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu			
	a) s ľahkými prejavmi (bez známk progresie)	20-30	
	b) so stredne ťažkými prejavmi		
		ba) do troch rokov liečby	50
		bb) po troch rokoch liečby	30-40
	c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.)	80-100	
5. Plazmocytóm (myelóm)			
	a) s ľahkými prejavmi (bez známk progresie)	20-30	
	b) so stredne ťažkými prejavmi	30-50	
	c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, bolesti)	80-100	
6. Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)			
	a) štádium I. - III.A		
		aa) počas dlhodobej liečby (viac ako šesť mesiacov) do skončenia liečby	50-70
		ab) v nľnei remisii (po troch rokoch)	40
	b) štádium III.B - IV.		
		ba) do skončenia liečby	70-80
		bb) v plnej remisii (po troch rokoch)	50
7. Chronická myeloidná leukémia (myelóza)			
	a) chronická fáza v liečbe, s prejavmi na celkový stav	40-60	
	b) akútne zhoršenie	70-100	
8. Chronické myeloproliferačné ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytopénia, osteomyeloskleróza a pod.)			
	a) ľahká forma	20-30	
	b) stredne ťažká forma	30-40	
	c) ťažká forma	80-100	
9. Akútne leukémia a difúzne non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii)			
	a) u detí až do skončenia liečby	100	
	b) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov	50-60	

10. Ostatné chronické krvné choroby		
	a) bez zjavných prejavov	10
	b) s miernymi prejavmi	20-40
	c) s ťažkými prejavmi	50-80
11. Niektoré poruchy mechanizmu imunity		
	a) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce ťažké obmedzenie výkonnosti	50-80
	b) typ protilátkový, bunkový, fagocytárny a komplementárny	20-40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti hematologických zmien, pôsobenia na iné orgány a na celkový zdravotný stav.

III. Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy funkcie štítnej žľazy		
1.1. hyperfunkcia		
	a) ľahký stupeň (vegetatívne prejavy)	0-10
	b) stredný stupeň (s pretrvávajúcou tachykardiou, značná strata na hmotnosti a pod.)	20-30
	c) ťažký stupeň (výrazné schudnutie, tyreotoxické srdce, psychické a očné poruchy)	40-50
1.2. hypofunkcia nedostatočne kompenzovaná liečbou		20-30
2. Zhubný nádor štítnej žľazy		
	a) včasné odstránenie v štádiu T 1-2 NOMO	30-50
	b) v priebehu onkologickej liečby alebo neliečiteľné formy	80-100
	c) po stabilizácii (do piatich rokov)	20-40
3. Stav po strumektómii pre nezhubné ochorenie uspokojivo kompenzované liečbou		0-10
4. Tetanický syndróm ťažkého stupňa (výskyt častých závažných záchvatov)		20
5. Chronická nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)		
	a) dobre kompenzovaná liečbou	20
	b) stredne ťažká forma (začínajúca adynamia, chudnutie, zníženie výkonnosti)	30-40
	c) ťažká forma (s výraznou adynamiou, chudnutím, s opakovanými krízami a podstatným znížením výkonnosti)	50-70
6. Zvýšená funkcia kôry nadobličiek (Cushingov syndróm, Connov syndróm, adrenogenitálny syndróm)		

	a) s komplikáciami na rôznych orgánových systémoch, prejavy svalovej slabosti	20-30
	b) iatrogénny Cushingov syndróm	10
7. Nádory nadobličiek vrátane stavov po odstránení nádorov		
	a) v priebehu onkologického liečenia alebo neliečiteľné formy	80-100
	b) po stabilizácii zdravotného stavu (po dvoch rokoch)	40
8. Poruchy hypotalamo-hypofyzárneho systému		
	a) dobre kompenzované liečbou	20
	b) závažné prejavy na ostatných orgánoch s obmedzením výkonnosti	40-50
9. Nádory podmozgovej žľazy		
	a) v priebehu onkologického liečenia	80
	b) po stabilizácii (po dvoch rokoch) podľa ovplyvnenia celkového stavu	40
10. Cukrovka		
	a) kompenzovateľná perorálnou liečbou a diétou alebo kompenzovateľná inzulínom a diétou bez komplikácií	30-50
	b) ťažko kompenzovateľná inzulínom alebo cukrovka detského veku	50-60
	c) chronické komplikácie cukrovky (diabetická angiopatia, neuropatia, diabetická noha)	60-70
11. Fenylketonúria		
	a) u detí bez prejavov poškodenia mozgu do 18. roku veku	50
	b) u dospelých bez prejavov poškodenia mozgu počas trvania liečby diétou	30-50
12. Mukoviscidóza (cystická fibróza)		
	a) bez komplikácií	20-30
	b) s pľúcnyimi prejavmi, črevnými prejavmi mierneho stupňa (telesný vývoj zodpovedá veku)	30-50
	c) s pľúcnyimi prejavmi, črevnými prejavmi so zníženou telesnou výkonnosťou	40-60
	d) s pľúcnyimi prejavmi, črevnými prejavmi ťažkého stupňa s výrazne oneskoreným telesným vývojom	60-90

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa závažnosti vlastnej choroby s prihliadnutím na sekundárne zmeny, komplikácie (odchýlky laboratórnych hodnôt od normy sa nehodnotia).

Miera funkčnej poruchy pri poruchách metabolizmu tukov, dne a alimentárnej tučnosti sa určí podľa závažnosti komplikácií jednotlivých orgánových systémov.

IV. Duševné poruchy a poruchy správania

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy psychického vývoja detí		
	a) ľahké formy	10-20
	b) stredne ťažké formy	30-40
	c) ťažké formy	50-80
	d) zvláštne psychické poruchy a pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus)	60-100
2. Poruchy osobnosti a správania u dospelých		
	a) mierne narušenie sociálnej prispôsobivosti	20
	b) ťažké narušenie sociálnej prispôsobivosti	50
3.	Mentálna retardácia	
	a) ľahká mentálna retardácia IQ 50-69	
		1 . horné pásmo
		2. stredné pásmo
		3. dolné pásmo
	b) stredná mentálna retardácia IQ 35-49	50-60
	c) ťažká mentálna retardácia IQ 20-34	80-90
	d) hlboká mentálna retardácia IQ pod 20	100
	e) geneticky podmienená mentálna retardácia s multiorgánovým postihnutím podľa klinického stavu (napr. Morbus Down)	50-100
4. Afektívne poruchy nálady (manické, depresívne, periodické)		
	a) ľahké formy	20
	b) stredne ťažké formy	30
	c) ťažké formy	60
5. Neurotické stresové a somatoformné poruchy		
	a) ľahké formy	10
	b) stredne ťažké formy	20-40
	c) ťažké formy (obsedantné neurózy)	50-60
6. Schizofrénia, schizotypové poruchy, poruchy s bludmi a halucináciami		
	a) ľahké formy	20
	b) stredne ťažké formy	50-60
	c) ťažké formy	90
7. Alkoholizmus		
	a) alkoholizmus I. a II. fáza	0-10
	b) alkoholizmus III. a IV. fáza	40-50
8. Duševné poruchy a poruchy správania spôsobené psychoaktívnymi látkami		
	a) ľahká forma	0-10
	b) stredne ťažká forma (do dvoch rokov od začiatku postihnutia)	30
	c) ťažká forma	60-70

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu zdravotného postihnutia, výskytu atakov, psychiatrického a psychologického nálezu, podľa narušenia sociálneho života, narušenia orientácie, intelektu, pamäti, myslenia, správania, emotivity, afektivity a pri úplnom rozpade osobnosti s trvalým dozorom sociability sa určia maximálne hodnoty miery funkčnej poruchy.

V. Nervový systém (Poškodenie mozgu a miechy)

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1 . Cievne ochorenia mozgu, vnútrolebková výdutina, stavy po vnútrolebkovom krvácaní, ložiskovej nedokrvenosti mozgu	
a) ľahká forma	20
b) stredne ťažká forma	40-60
c) ťažká forma	70-90
2. Zápalové ochorenia mozgu, neurodegeneratívne ochorenia, polyradikuloneuritídy, polyneuropatia a detská obrna	
a) ľahká forma	20-30
b) stredne ťažká forma	40-60
c) ťažká forma	70-90
3. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza	
a) ľahká forma (s monoparézou, očné príznaky) - Kurtzkého škála 1-2	20-40
b) stredne ťažká forma - Kurtzkého škála do 4	40-60
c) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza) - Kurtzkého škála nad 4	70-100
4. Epilepsia	
a) veľmi zriedkavé veľké záchvaty s pauzami dlhšími ako jeden rok, malé záchvaty s pauzami mesiacov	20
b) zriedkavé veľké záchvaty s pauzami mesiacov, malé záchvaty s pauzami týždňov	30-40
c) stredne časté veľké záchvaty s pauzami týždňov, malé záchvaty s pauzami dní	40-50
d) časté veľké záchvaty týždenne alebo séria generalizovaných záchvatov, alebo malé záchvaty denne	50-60
5. Narkolepsia, hypersomnia	
a) ojedinelé záchvaty	10
b) stredne časté záchvaty	20
c) veľmi časté záchvaty s obmedzením výkonnosti	30
6. Migréna	
a) ľahká forma	0
b) stredne ťažká forma	10
c) ťažká forma so silne vyjadrenými sprievodnými prejavmi spravidla jedenkrát týždenne	20
7. Neuralgia troj klaného nervu	

a) ľahká forma	10
b) stredne ťažká forma	20
c) ťažká forma so silnou bolesťou (pri neúspešnej konzervatívnej liečbe)	40-60
8. Periférna obrna lícneho nervu	
a) jednostranná, úplná obrna	20-30
b) obojstranná kompletná obrna so závažnými trvalými komplikáciami	40-60
9. Parkinsonova choroba	
a) ľahká forma (ojedinelé mimovoľne pohyby)	20
b) stredne ťažká forma	40-60
c) ťažká forma (tremor, rigidita, bradykinéza)	60-80
10. Centrálné vegetatívne poruchy (závraty, poruchy spánku, vazomotorické poruchy, úporné bolesti hlavy)	
a) ľahká forma	10
b) stredne ťažká forma (s ojedinelými synkopami)	20
c) poruchy s častejšími záchvatmi a s dôsledkami na celkový stav	30
11 . Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy	
a) ľahká forma	10-20
b) stredne ťažká forma (postihnutie oboch končatín)	40-60
c) ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)	80-90
12. Poruchy osobnosti, správania, intelektu a komunikácie následkom dysfunkcie mozgu (napr. demencie rôzneho typu a etiológie, organický psychosyndróm)	
a) ľahká forma	20
b) stredne ťažká forma	40-60
c) ťažká forma	80-100
13. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)	
a) monoplégia	50
b) hemiplégia	80
c) paraplégia	90
d) kvadruplégia	100
e) monoparéza	10-30
f) hemiparéza	20-60
g) paraparéza	20-60
h) kvadruparéza	40-80
i) ľahká paréza reziduálna (hodnotí sa dominantnosť horných končatín)	10-20
14. Nádory lebkovej dutiny a miechového kanála	
a) stav po operácii, počas onkologického liečenia do piatich rokov	80
b) po stabilizácii s miernym reziduálnym nálezom	40
c) neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím	90
d) neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím	100
15. Poškodenie miechy	

a) monoplégia	50	
b) hemiplégia	80	
c) paraplégia	90	
d) kvadruplégia	100	
e) monoparéza	10-30	
f) hemiparéza	40-50	
g) paraparéza	50-60	
h) kvadraparéza	60-80	
i) akroparéza, reziduálna ľahká paréza	10-20	
j) poruchy vyprázdňovania močového mechúra a konečníka ako následok poškodenia chrbtice a miechy		
	1. ľahká forma	30-60
	2. ťažká forma (úplná inkontinencia)	100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa poruchy funkcie, výpadových javov, výskytu záchvatov, dĺžky trvania záchvatov a výskytu vegetatívnych porúch, neurologického nálezu, psychiatrického nálezu, psychologického nálezu a komplikácií.

Miera funkčnej poruchy pri poškodení miechy sa určí podľa funkčných porúch na končatinách, porúch inervácie močového mechúra a konečníka s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny.

VI. Zrak

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %	
1 . Úplná slepota oboch očí	90	
2. Praktická slepota oboch očí (V 3/60 - 1/60)	80	
3. Slabozrakosť (V 6/60 - 3/60)		
	a) deti a mladiství do skončenia školskej dochádzky	70
	b) ostatné prípady	50-60
4. Slabozrakosť (V 6/18 - 6/60)		
	a) deti do skončenia povinnej školskej dochádzky	50-60
	b) ostatné prípady	40-60
5. Výpady zorného poľa (úplné, polovičné a kvadrantové) Pri neúplných, polovičných alebo kvadrantových výpadoch je potrebné primerane znížiť percentuálne vyjadrenie miery funkčnej poruchy		
	a) homonymná hemianopsia	30-40
	b) bitemporálna hemianopsia	30
	c) binasálna hemianopsia	10
	d) homonymný horný kvadrant	20
	e) homonymný dolný kvadrant	30
	f) výpad zorného poľa (laterálne) pri strate alebo slepote druhého oka	60-70

6. Koncentrické zúženie (obojstranné zúženie zorného poľa na 10° až 5° centrálné je ťažká slabozrakosť, zúženie zorného poľa na 5° centrálné je praktická slepota aj pri zachovaní zrakovej ostrosti)	
a) koncentrické zúženie zorného póla na 5° centrálné pri normálnom zornom poli druhého oka	20
b) obojstranné zníženie na 30° od centra	10-20
7. Koncentrické zúženie pri strate druhého oka	
a) na 50° od centra	40
b) na 30° od centra	60
c) na 10° až 5° od centra	80-90
8. Nepravidelné výpady zorného poľa, veľké skotómy v 50° zorného poľa binokulárne	30-40
9. Obrna očných svalov, ak oko musí byť vylúčené z videnia	20
10. Diplopia	10-20
11. Strabizmus u detí	10-20
12. Strata jedného oka	30
13. Strata šošovky bez poruchy zrakovej ostrosti	
a) jedného oka u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky	10-20
b) oboch očí u dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky	20-30
c) ostatné prípady, jedného oka oboch očí	10 20
14. Strata šošovky jedného oka pri slepote alebo strate druhého oka	
a) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky	40-50
b) ostatné prípady	30-40
15. Odstránenie oka pre zhubný nádor	
a) počas onkologického liečenia	100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40
c) neliečiteľné formy	100

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia zrakovej ostrosti s korekciou, rozsahu zorného poľa, hĺbkového videnia, okulomotoriky, slzenia, citlivosti na prach, na svetlo, ochorenia očných adnexov a adaptácie.

Miera funkčnej poruchy ptózy hornej mihalnice s úplným uzáverom očnej štrbiny, glaukómu (zelený zákal) a ostatných očných chorôb sa určí podľa stupňa zúženia zorného poľa, zrakovej ostrosti, schopnosti orientovať sa a psychického stavu.

VII. Sluch a poruchy ústroja rovnováhy

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1. Vrodená obojstranná praktická hluchota u detí alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla pred rozvinutím reči, do skončenia prípravy na povolanie	70-80
2. Získaná obojstranná praktická hluchota alebo hluchota u detí, ktorá sa vyskytla až po rozvinutí reči, do 18. roku veku	60-80
3. Obojstranná praktická hluchota dospelých alebo hluchota dospelých	60-70
4. Obojstranná ťažká nedoslýchavosť u detí a dospelých zisťovaná slovnou alebo objektívnou audiometriou	50-60
5. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u detí	50
6. Obojstranná stredne ťažká nedoslýchavosť u dospelých	30-40
7. Poruchy rovnováhy (objektivizovateľné poruchy vestibulárneho ústroja)	
a) ľahké závraty s hučaním v ušiach	20-30
b) stredne ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi)	30-40
c) ťažké závraty (so značnou neistotou pri polohe stojmo a pri chôdzi) alebo ťažký tinnitus	50-70
8. Komplikovaný chronický zápal stredného ucha	20-30
9. Strata jednej ušnice	10
10. Strata oboch ušnic	30
11 . Zhubné nádory (hltana, mandlí, hrtana, slinných žliaz a pod.)	
a) po odstránení nádoru pri onkologickej liečbe do piatich rokov	40-80
b) neliečiteľné formy zhubných nádorov	90-100
c) po stabilizácii zdravotného stavu	40

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa miery zníženia sluchu, poruchy reči, následkom poškodenia sluchu, hučania v ušiach, bolesti v ušiach, poruchy rovnováhy, závratov, sociálnej adaptability a obmedzenia komunikačných schopností.

VIII. Srdce a obehové ústrojenstvo

A. Postihnutie srdca

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1. Vrodené alebo získané srdcové chyby a postihnutie veľkých srdcových ciev, ischemická choroba srdca, stavy pri infarkte myokardu, chronické reumatické choroby srdca, stavy po operáciách, kardiomyopatie, stavy pri myokarditídach a pod.	
a) bez podstatného zníženia výkonnosti žiadne prejavy nedostatočnosti ako dýchavičnosť, anginózne bolesti i pri obvyklom silnejšom telesnom zaťažení (napr. rýchla chôdza 7-8 km/hod., ťažká telesná práca, maximálna záťaž 100 W)	0-10
b) stavy zodpovedajúce NYHA II stupeň postihnutia zodpovedá poklesu výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 5-6 km/hod., ťažkosti pri stredne ťažkej telesnej práci a rekreačných aktivitách, maximálna záťaž 75 W)	20-40
c) stavy zodpovedajúce NYHA III stupeň postihnutia zodpovedá podstatnému obmedzeniu bežnej fyzickej aktivity (napr. prechádzka 3-4 km/hod., stúpanie po schodoch na 1. poschodie, ľahká telesná práca, maximálna záťaž 50 W)	50-60
d) stavy zodpovedajúce NYHA IV zjavné prejavy srdcového zlyhania v pokoji, dlhodobotrvajúce dekompenzácie, neschopnosť akejkoľvek fyzickej aktivity (max. 25 W)	70-90
2. Poruchy srdcového rytmu	
a) bez hemodynamických účinkov alebo pri nepatrných subjektívnych ťažkostiach	0-10
b) s ľahkými hemodynamickými poruchami, liečbou kompenzované poruchy	20-30
c) s ťažkými hemodynamickými poruchami (záťažová insuficiencia) alebo liečbou ťažko ovplyvniteľné poruchy	50-70
3. Stavy po operácii srdca, náhradách srdcových chlopní, operácii srdcových chýb, po resekcii aneuryzmy, revaskularizačných výkonoch	
a) s dobrým funkčným výsledkom	20-30
b) pri závažnom znížení výkonu	50-80
4. Implantácia kardiostimulátora	20-30
5. Stavy po koronárnej angioplastike s dobrým efektom	10-30
6. Chronické cor pulmonale miera funkčnej poruchy sa určí podľa porúch výkonnosti srdca a pľúc s prihliadnutím na stupeň hromadenia krvi v pľúcach a pľúcnej hypertenzie	50-70
7. Transplantácia srdca do piatich rokov od transplantácie podľa funkcie a liečby	40-60

B. Postihnutie ciev

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
-------------------------------------	-----------------------------------

1 . Artériovenózne píšťaly			
	a) bez hemodynamického účinku alebo porúch penlerneho prekrvenia	0-10	
	b) s nepatrnými hemodynamickými vplyvmi alebo s poruchami periférneho prekrvenia	20-30	
	c) s manifestnými prejavmi	30-50	
2.	Aneurizmy (podľa polohy a veľkosti)		
	a) bez funkčnej poruchy, bez obmedzenia výkonnosti	0-10	
	b) malé periférne vyduté	0-10	
	c) iné	20-30	
	d) disekujúce aneurizmy aorty, veľké aneurizmy abdominálnej aorty a veľkých panvových tepien s obmedzením výkonnosti	40-60	
3. Tepnové uzáverové choroby - uzávěry tepien dolných končatín			
	a) štádium I. podľa Fontainea na jednej dolnej končatine alebo na oboch končatinách	0-10	
	b) štádium II. podľa Fontainea s obmedzením kolaterálneho obehu, klaudikácie po 300 m až 500 m (Doppler na nohe 80-100 mm Hg)	20-30	
	c) štádium III. podľa Fontainea klaudikácie po 50 m-300 m (Doppler na nohe 60-80 mm Hg)	40-50	
	d) štádium IV. podľa Fontainea s bolesťami v pokoji a trofickými zmenami	50-70	
4. Kŕčové žily			
	a) s nepatrným opuchom na končatine s minimálnymi trofickými zmenami na koži bez ťažkostí, jedna alebo obidve končatiny	0-10	
	b) s výraznými ťažkosťami z hromadenia krvi v žilách, prítomnými recidívami zápalu - jedna alebo obidve končatiny	10-20	
	c) s chronickými recidivujúcimi defektmi podľa rozsahu a výskytu na jednej alebo na oboch končatinách	30-50	
	d) chronická venózna insuficiencia		
		1. jedna dolná končatina	30-40
		2. obidve dolné končatiny	40-60
	e) posttrombotický syndróm v oblasti panvy alebo dutých žíl - prichádza do úvahy vyššie hodnotenie		
5. Lymfedém na jednej alebo na oboch končatinách			
	a) so zväčšením obvodu končatiny do 5 cm	0-10	
	b) so zväčšením obvodu nad 5 cm, s obmedzením pohybu končatiny pre väčšiu hmotnosť a pre ovplyvnenie kĺbových funkcií	20-30	
	c) pri neschopnosti používať postihnutú končatinu	40-60	
6. Poruchy krvného tlaku			
	a) 1 . stupeň - mierna forma	0-20	
	b) 2. stupeň - stredná forma	20-30	
	c) 3. stupeň - ťažká forma	40-60	
7. Funkčné srdcovocievne syndrómy, ortostatická hypotónia			

a) s ľahkými klinickými prejavmi	0-10
b) s častými závratmi a so sklonom ku kolapsom	20-30

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa rozsahu a stupňa obmedzenia výkonnosti srdcovocievneho systému. Na určenie miery funkčnej poruchy zdravotného postihnutia je menej dôležitý druh ochorenia srdca a obehového ústrojenstva ako rozdielna strata výkonu podľa už prítomného štádia ochorenia.

Pri tepnových uzáveroch na hornej končatine sa určí stupeň funkčnej poruchy tak, že sa porovnáva s inými zdravotnými postihnutiami v tejto oblasti.

Pri veľmi výrazných poruchách – lymfedéme treba brať do úvahy zohyzdenie končatiny.

Pri poruche krvného tlaku sa miera funkčnej poruchy určí po systematickej farmakoterapii.

IX. Dýchacia sústava

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %	
1. Chronický zápal priedušiek bez poruchy ventilácie		0-10	
2. Opakujúce sa zápaly pľúc so spastickou zložkou		10-20	
3. Chronická astmatická bronchitída so spastickou zložkou, bronchiektázia, emfyzém pľúc, pneumokoniózy, pľúcna fibróza, neaktívna tuberkulóza, stavy po operácii pľúc s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií			
	a) ľahký stupeň	20	
		1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytuje už pri stredne ťažkom zaťažení	
		2. stredne ťažká telesná práca	
		3. zníženie pľúcnych funkcií o menej ako 50 % príslušných hodnôt	
	b) stredný stupeň	30-40	
		1. dýchavičnosť, ktorá sa vyskytne už pri každodennom ľahkom zaťažení	
		2. ľahká telesná práca	
		3. zníženie pľúcnych funkcií až o 50 %	
	c) ťažký stupeň	50-70	
		1. dýchavičnosť už pri minimálnom zaťažení alebo v pokoji	
		2. zníženie pľúcnych funkcií väčšie ako 50 %	
	4. Bronchiálna astma		

	a) bez trvalého obmedzenia funkcie so sporadickými záchvatmi	10
	b) s trvalým obmedzením pľúcnych funkcií	
	1. ľahký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií pod 50 %)	20
	2. stredný stupeň (zníženie pľúcnych funkcií o 50 %)	30-40
	3. ťažký stupeň (zníženie pľúcnych funkcií viac ako 50 %)	50-70
5. Zhubné nádory (bronchiálne alebo pľúcne)		
	a) počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby	80
	b) neliečiteľné formy	100
	c) stav po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií	40-50
	d) obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa	60-80
6. Bronchiálna astma u detí, astmatický syndróm		
	a) ľahká forma astmatickej bronchitídy bez trvalého obmedzenia ventilačnej poruchy pľúc, ktoré trvajú aspoň šesť týždňov v roku	20-30
	b) stredná forma-stredne ťažká perzistujúca astmatické bronchitídy trvajúce aspoň dva až tri mesiace v roku s trvalou ventilačnou poruchou pľúc ľahkého až stredného stupňa	30-50
	c) ťažká forma trvalá ventilačná porucha stredne ťažkého až ťažkého stupňa	50-70
	d) trvalá globálna dychová nedostatočnosť s prejavmi dekompenzácie	80-90
7. Sarkoidóza		
	1. zväčšenie vnútrohrudných uzlín s ľahkým funkčným obmedzením a klinickou symptomatológiou	20
	2. postihnutie pľúc s klinickou symptomatológiou	20-70
8. Ústna dutina a horné dýchacie cesty		

	a) defekt pier so stálym slinotokom, s poruchou reči a príjmu potravy	20-30
	b) ťažká porucha funkcie jazyka, artikulácie, žuvania s možnosťou prijímať len tekutú stravu	50-60
	c) rozsiahly defekt podnebia s protézou	20
	d) strata podnebia bez možnosti korekcie protézou s poruchou reči a príjmu potravy	50-60
	e) vrodené rászštepy pier, čeľustí, podnebia u detí do dosiahnutia dobrého funkčného stavu orofaciálnej sústavy	40-60
	f) stavy po operáciách rászštepu pier, čeľustí, podnebia u dospelých podľa poruchy reči a prehltnania	20-30
	g) izolovaný rászštep pier alebo podnebia	20-30
	h) trvalá tracheostómia (celkový stav, komplikácie)	50-60
	i) obojstranná obrna nervu recurrens s poruchou hlasu	30
	j) poruchy artikulácie a hlasu	
	1. ťažko zrozumiteľná reč	20-30
	2. nezrozumiteľná reč	50-60
	3. ťažká zajakavosť	20-30
	k) iné poruchy priechodnosti dýchacích ciest (podľa ovplyvnenia dýchania a výkonnosti)	20-30
9.	Chronický zápal prínosových dutín ťažkého stupňa s komplikáciami (hnisavá sekrécia, dráždenie trojkľaného nervu, tvorba polypov, vnútroľbové, očné)	20-40
10.	Úplná strata čuchu	10-20

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa vplyvu vlastnej choroby na celkový stav, pôsobenia a dôsledkov na ostatné orgány. Pri sarkoidóze sa určí podľa rozsahu obmedzenia pľúcnych funkcií.

X. Tráviace ústrojenstvo

A. Ochorenie pažeráka

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Trakčný divertikul (podľa veľkosti a ťažkosti)		0-10
2. Pulzný divertikul		
	a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy	0-10
	b) so značnou prekážkou pri príjme potravy	20-40
3. Funkčná alebo organická stenóza pažeráka		
	a) bez podstatnej prekážky pri príjme potravy	0-10
	b) s poruchou pri príjme potravy	20-30
	c) so značnou poruchou výživy a výkonnosti	40-60
4. Malígný nádor pažeráka		
	a) po radikálnej a onkologickej liečbe nádoru treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná	40-80
	b) so značným úbytkom výživy a výkonnosti	90-100
5. Totálna náhrada pažeráka s poruchou príjmu potravy, s obmedzením výživy a výkonnosti, so zohľadnením zohyzďujúceho pôsobenia		70-90

B. Ochorenie žalúdka

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronické, recidivujúce vredy žalúdka a dvanástnika		
	a) recidivujúce po dvoch-troch rokoch	0-10
	b) s častejšími recidívami ochorenia	20-30
	c) s trvalým výrazným znížením výživy a výkonnosti s komplikáciami	40-50
2. Totálne odstránenie žalúdka, hodnotí sa vplyv na stav výživy a úbytok výkonnosti, prípadné komplikácie		50-80
3. Chronická gastritída (ireverzibilná zmena sliznice žalúdka)		
	a) bez podstatných klinických prejavov	0-10
	b) s úbytkom výživy a výkonnosti alebo s výraznými komplikáciami	20-30
4. Dráždivý žalúdok (funkčná porucha)		0-10
5. Čiastočné odstránenie žalúdka, gastroenteroanastomóza		
	a) s dobrou funkciou	10-20
	b) s komplikáciami (napr. dumpingový syndróm, ulcus pepticum)	30-50
6. Čiastočné alebo úplné odstránenie žalúdka pre malignitu - treba počkať spravidla päť rokov, či bola liečba úspešná		
	Počas tohto obdobia:	
	a) pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer - T1-NOMO)	40-50
	b) po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcim onkologickom liečení	80-100
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100

C. Ochorenie tenkého a hrubého čreva

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronický zápal čriev, divertikulitída, divertikulóza, čiastočné resekcie čreva alebo iné črevné poruchy		
	a) bez podstatných klinických prejavov (napr. syndróm dráždivého čreva)	0-10
	b) so silnejšími trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy a pod.)	20-30
	c) so značným úbytkom hmotnosti a výkonnosti	30-50
2. Colitis ulcerosa, idiopatická proktokolitída, Crohnova choroba		

	a) s miernym účinkom na celkový stav (hnačky, znížená výkonnosť)	10-20
	b) so stredne závažným účinkom na celkový stav (trvalé alebo často recidivujúce zápaly sliznice s krvácaním)	30-50
	c) s ťažkým účinkom na celkový stav a výkonnosť (perforácie, opakované operácie, malnutrícia)	60-80
3. Črevné malabsorpcie (coeliakia, sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou)		
	a) bez podstatných klinických prejavov pri dietoterapii u dospelých	30-50
	b) u detí do skončenia povinnej školskej dochádzky	40-60
	c) na liečbu rezistentné pokročilé formy u dospelých so znížením stavu výživy a výkonnosti	60-80
4. Po odstránení malígneho tumoru čreva (treba počkať spravidla päť rokov na efekt liečby)		
	V priebehu tohto obdobia:	
	a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1-NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby	50-60
	b) s vytvorením trvalej kolostómie	70-80
	c) počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie	60-70
	d) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	e) neliečiteľné formy	90-100
5. Stav po odstránení podstatnej časti tenkého alebo hrubého čreva (nenádorové príčiny)		
6. Zrasty v brušnej dutine		
	a) bez výraznej klinickej symptomatológie	0-10
	b) s poruchami pasáže	20-30
	c) s častými recidivujúcimi ileóznymi stavmi	50-60
7. Hemoroidy		
	a) bez výrazných ťažkostí s občasným krvácaním	0-10
	b) s častými recidivujúcimi zápalmi, trombotizovaním alebo silnejším krvácaním	10-20
8. Vyvrátenie konečníka		
	a) malý reponibilný	0-10
	b) trvalý s krvácaním	20-40
9. Slabosť zvierča riti s občasným odchodom stolice		
10. Strata zvierča riti		
11 . Perianálne píšťaly		
	a) nepatrné, bez stálej sekrécie	0-10
	b) s častou alebo trvalou sekréciou	20-40
12. Umelá ríť (kolostómia, ileostómia)		
	a) s dobrou možnosťou uzáveru	50-60
	b) bez možnosti uzáveru	60-80

D. Ochorenie pečene, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1. Ochorenia pečene (bez ohľadu na etiológiu) Funkčná hyperbilirubinémia	0-10
2. Chronická perzistujúca hepatitída	10-20
3. Chronická agresívna hepatitída - podľa aktivity a funkčnej poruchy	
a) ľahkého stupňa	10-20
b) stredného stupňa	20-40
c) ťažkého stupňa	50-90
4. Fibróza pečene	
a) ľahkého stupňa	0-10
b) ťažšieho stupňa	10-20
5. Zápalová cirhóza pečene	
a) stacionárna	20-30
b) s miernou aktivitou	30-40
c) s vyššou aktivitou, progredujúca	50-70
d) portálna hypertenzia po skratovej operácii	50-70
6. Steatóza pečene, toxické poškodenie pečene	
a) bez mezenchýmových reakcií	0-10
b) steatóza s hepatitídou, chronická toxická hepatitída - ako pri chronickej agresívnej hepatitíde	50-90
7. Resekcia pečeneového laloka	50-70
8. Malígne nádory pečene, žlčníka, žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy	
a) počas onkologickej liečby	90-100
b) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
c) neliečiteľné formy	90-100
9. Transplantácia pečene (podľa funkčného nálezu, stavu výživy a výkonnosti)	50-90
10. Chronické zápal intrahepatálnych žlčových ciest - hodnotí sa ako pri chronickej agresívnej hepatitíde alebo cirhóze	20-80
11. Dyskinéza žlčových ciest sa hodnotí podľa výskytu biliárnych kolík s odstupom viacerých mesiacov	0-10
12. Ochorenia žlčových ciest (litiáza, chronické recidivujúce zápal)	
a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov, zápalov s odstupom rokov	0-10
b) s častejšími kolikami a so zápalmi, s intenzívnymi ťažkosťami	10-20
c) s dlhotrvajúcimi zápalmi alebo s komplikáciami	20-40
13. Strata žlčníka	
a) so zvyškovými funkčnými poruchami, postcholecystektomický syndróm	10-20
b) pri dlhšie trvajúcich kolikách	20-40

14. Chronické ochorenie podžalúdkovej žľazy podľa účinku na celkový zdravotný stav, častosť a rozsah bolesti		
	a) čiastočné zníženie výkonnosti, slabšia výživa, dyspeptické ťažkosti, hnačky	0-10
	b) zreteľné zníženie výkonnosti, oslabenie výživy, častejšie hnačky	30-40
	c) výrazné zníženie výživy a výkonnosti, tukové stolice	40-60

E. Prietrž

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1. Slabinová, skrotálna alebo stehenná prietrž podľa veľkosti a reponibility	
a) jedno- alebo obojstranná bez klinickej symptomatologie	0-10
b) pri klinickej symptomatológii (bolesti, obmedzenie pohybu pri záťaži a pod.)	10-20
2. Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej línii podľa kinickej symptomatologie	0-10
3. Prietrž v jazvách po brušnej operácii	
a) bez výraznej symptomatologie podľa veľkosti	0-10
b) so značným obmedzením brušného lisu	10-20
c) pri poruchách pasáže bez značných komplikácií	20-30
d) pri častých recidivujúcich prejavoch ileózných stavov	30-40
4. Prietrž bránice	
a) pažeráková sklzná prietrž	0-10
b) iné malé bránicové prietrže bez podstatnej funkčnej poruchy	0-10
c) väčšie bránicové prietrže podľa stupňa funkčnej poruchy (refluxná ezofagitída)	10-20
d) prietrž s rozsiahlym premiestnením brušných orgánov s poruchami pasáže a s vplyvom na kardiopulmonálny systém	40-60
5. Hydrokéla a varikokéla	0-10

Miera funkčnej poruchy sa pri organických a funkčných ochoreniach zažívacieho ústroja určí podľa stupňa a úbytku výkonnosti, stupňa orgánových porúch a podľa potreby osobitných režimových opatrení. Pri alergicky podmienených ochoreniach má význam zamedzenie pôsobenia alergénov.

Po selektívnej proximálnej vagotómii prichádza hodnotenie miery funkčnej poruchy do úvahy, ak sú prítomné črevné poruchy (hnačky) alebo pretrvávajú účinky základného ochorenia.

Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálne píšťaly treba hodnotiť podľa lokality, rozsahu, funkcie zvierača a črevnej stený.

Pri rozsiahlom vyvrátení konečníka, kolostómii, ileostómii a silne secernujúcich sterkorálnych fistúl treba hodnotiť i psychickú ujmu (najmä obmedzenie spoločenského styku, sexuálneho života).

XI. Ochorenie kože

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1 . Jazvy po popálení alebo poleptaní na ploche		
	a) do 40 % kožného krytu	10-20
	b) nad 40 % kožného krytu (dekubity)	20-40
2. Ekzémy		
	a) chronický ekzém (napr. kontaktný ekzém) na viditeľných častiach tela (ťažšieho stupňa)	20-30
	b) endogénny ekzém, atopická dermatitída s dlhotrvajúcimi prejavmi generalizovaného charakteru, dermorespiračný syndróm	30-50
	c) seboroický ekzém ťažšieho stupňa s postihnutím viditeľných častí tela	50-60
3. Acne vulgaris (Induratívna forma) s tvorbou vredov so značnou kozmetickou ujmu		20-30
4. Acne conglobata s opakovanou tvorbou píšťal, vredov a trvalou premenou tkaniva na jazvy		30-40
5. Systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythematosus, dermatomyozitída, sklerodermia)		
	a) kožné zmeny ohraničené na predilekčných miestach alebo pri väčšom rozšírení, podľa funkčného postihnutia	20-30
	b) rozsiahle kožné zmeny, ulcerácie, obmedzenie pohybov v kĺboch, postihnutie vnútorných orgánov	40-60
6. Pľuzgierovité kožné ochorenia (napr. pemfigus)		
	a) ťažšie postihnutie Kože a slizníc	30-40
	b) generalizované postihnutie kože a slizníc	60-80
7. Psoriasis vulgaris		
	a) s výskytom na predilekčných miestach	10-20
	b) generalizovaná forma s kĺbovým postihnutím, remisiami trvajúcimi niekoľko mesiacov	30-50
	c) generalizovaná ťažká forma postihujúca celý povrch tela bez období zlepšenia	50-60
8. Erythrodermia		
	a) pri malej intenzite zápalového procesu	20-30
	b) pri závažnej intenzite zápalového procesu s ťažkou alteráciou celkového stavu	40-50
9. Ichtvóza		
	a) stredne ťažká forma dlhodobo postihujúca trup a končatiny	20-30
	b) ťažká forma postihujúca celý povrch tela	60-80
10. Dermatomykózy		

	a) postihnutie nechtových platničiek rúk a nôh, príľahlých častí kože, tiež v intertriginózných priestoroch	10-20
	b) systémové mykózy (napr. kandidóza, histoplazmóza, kokcidiomykóza) s rozsiahlymi prejavmi na koži, s postihnutím niekoľkých vnútorných orgánov, systémov s alteráciou celkového stavu	40-60
11 .	Recidivujúci eryzipel podlá stupňa lymfedému alebo obmedzenia pohyblivosti	20-30
12.	Recidivujúci pásový opar	20-30
13.	Úplná strata vlasov a ochlpenia	30-50
14.	Malígne tumory kože (s výnimkou malých bazaliómov)	
	a) po odstránení melanómu alebo iných malígnych kožných tumorov v počiatočnom štádiu	30-40
	b) v pokročilom štádiu, neliečiteľné formy	80-100
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	30-40

Miera funkčnej poruchy sa pri kožných ochoreniach určí podľa druhu, rozšírenia, lokality, účinku na celkový stav, sprievodné prejavy ako svrbenie, mokvanie, pálenie, zápach, tvorba jaziev.

XII. Pohybový a podporný aparát

A. Chrbtica, choroby kĺbov, zápalové reumatické ochorenie, iné choroby kostí, chrupiek, šliach, svalov

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy chrbtice		
	a) zlomeniny tela stavca do 1/4 tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice	10
	b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami dráždenia nervov a svalov, s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice	20-30
	c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihliadnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylozou vo viacerých segmentoch chrbtice	40-60
	d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu)	30-50
2. Scheurmannova choroba s trvalou staticko-dynamickou poruchou funkcie Scheurmannova choroba sa hodnotí po 18. roku života		

	a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou	0-10
	b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu	20-30
3. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba		
	a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň)	20-40
	b) ťažké formy (V. stupeň)	40-60
	c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov	70-100
4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupiek, vnútornej výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.)		
	a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných končatín a dolných končatín	10-20
	b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale obmedzuje výkonnosť organizmu	20-30
	c) ťažké formy, liečebne neovplyvniteľné, trvalé aktívne s progresiou, s výraznými deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím	50-70
5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia		
	a) ľahká forma lokálna alebo generalizovaná	10-20
	b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca	30-60
6. Chronická osteomyelitída		
	a) ľahký stupeň - lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule	20-30
	b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle	30-40
	c) ťažký stupeň - časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovania sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby)	50-70
7. Stavby po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)		
	a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie	20
	b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie	30-40
	c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie	50-70
8. Stavby po úrazoch panvy		
	a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu	10-20
	b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej chrbtice	30-40
	c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov	50-80
9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov		

	a) stavy po operácii pri prebiehajúcim onkologickom liečení	80
	b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov liečby)	40
	c) neliečiteľné formy	90-100
10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu		
	a) do 120 cm	50
	b) do 130 cm	40
	c) do 140 cm	30
11 . Svalové ochorenia		
	1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné	
	a) ľahšia forma s obmedzením hýbavosti	30-50
	b) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti	60-80
	c) ťažká forma (imobilita)	80-100
	2. myasténia gravis, myastenický syndróm	
	a) ľahké formy	20
	b) stredne ťažké formy s obmedzením hýbavosti	40-60
	c) ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti	60-80
12. Poúrazové svalové ochorenia		
	a) ľahká forma (napr. odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu)	0-10
	b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením	20-30
	c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením (pri dominantnej končatine + 10 %)	40-50

B. Postihnutie končatín

B.1. Horné končatiny

Druh zdravotného postihnutia	Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata oboch horných končatín	100
2. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny	100
3. Strata jednej hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo s veľmi krátkym kýpťom (ramena) (pri dominantnej končatine + 10 %)	60
4. Strata jednej hornej končatiny v ramene alebo v laktovom kĺbe (pri dominantnej končatine + 10 %)	50
5. Strata jednej hornej končatiny v predlaktí (pri dominantnej končatine + 10 %)	50
6. Strata jednej ruky (celej) (pri dominantnej končatine + 10 %)	50
7. Strata všetkých piatich prstov jednej ruky alebo iná strata úchopovej schopnosti jednej ruky	

	a) ľahký stupeň	20-30
	b) ťažký stupeň (pri dominantnej končatine + 10 %)	40-50
8. Strata všetkých desiatich prstov na rukách		70-80
9. Strata jednotlivých prstov na ruke		
	a) strata jedného palca	25
	b) strata dvoch palcov	40
	c) strata ukazováka, prostredníka, prstenníka	10
	d) strata malíčka	0
	e) strata prvého a druhého prsta, prvého a tretieho prsta, prvého a štvrtého prsta	30
	f) strata druhého a tretieho prsta, druhého a štvrtého prsta	30
	g) strata prvého a piateho prsta, druhého a štvrtého prsta	25
	h) strata tretieho a štvrtého prsta, tretieho a piateho prsta	25
	i) strata štvrtého a piateho prsta	20
	j) strata troch prstov s palcom	40
	k) strata štyroch prstov s palcom	50
	l) strata štyroch prstov (palec zachovaný)	40
	m) strata druhého až piateho prsta na oboch rukách	80
10. Stuhnutie ramenného kĺbu v priaznivej polohe pri pohyblivom ramennom kĺbe (pri dominantnej končatine + 10 %)		10-20
11. Stuhnutie v ramennom kĺbe v nepriaznivom postavení alebo v porušenej pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (pri dominantnej končatine + 10 %)		20-30
12. Obmedzenie pohyblivosti jedného ramenného kĺbu		
	a) ľahkého stupňa (elevácie do 120°, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie)	0-10
	b) stredného stupňa (elevácie do 90°, primerané obmedzenie rotácie, vystretie, ohnutie) (pri dominantnej končatine + 10 %)	10-20
13. Obmedzenie pohyblivosti oboch ramenných kĺbov		
	a) ľahkého stupňa	20
	b) stredného stupňa	30
	c) ťažkého stupňa	40
14. Instabilita ramenného pletenca		
	a) ľahkého stupňa (subluxácie)	10
	b) stredného stupňa (zriedkavé luxácie)	20-30
	c) ťažkého stupňa (časté luxácie) (pri dominantnej končatine + 10 %)	40
15. Pseudoartróza kľúčnej kosti		10
16. Pseudoartróza ramennej kosti		
	a) stabilná	30
	b) instabilná	50
17. Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu		

	a) ľahkého stupňa (vystretie/ ohnutie 0°- 30°- 120°)	0-10
	b) ťažšieho stupňa (najmä ohnutie vrátane obmedzenia rotácie predlaktia) (pri dominantnej končatine + 10 %)	20-30
18. Stuhnutie laktového kĺbu		
	a) v priaznivom postavení	10-20
	b) v nepriaznivom postavení (pri dominantnej končatine + 10 %)	30-40
19. Pseudoartróza vretennej a laktovej kosti		
	a) stabilná	10-20
	b) instabilná	20-30
20. Stav po zlomenine vretennej kosti a laktovej kosti zhojenej s dislokáciou a funkčnou poruchou susedných kĺbov		
	a) ľahký stupeň	20
	b) stredný stupeň	30
	c) ťažký stupeň (pri dominantnej končatine + 10 %)	40
21. Obmedzenie pohyblivosti zápästia		
	a) ľahkého stupňa (vystretie/ohnutie 30° - 0° - 40°)	0-10
	b) ťažšieho stupňa (vystretie/ohnutie) (pri dominantnej končatine + 10 %)	20-30
22. Stuhnutie zápästia		
	a) v priaznivom postavení (ľahká dorzálna extenzia možná)	10
	b) v nepriaznivom postavení (pri dominantnej končatine + 10 %)	20
23. Stav po zlomenine zápästných kostí alebo po zlomenine jednej záprstnej kosti a viacerých záprstných kostí s poruchou funkcie ruky		
	a) ľahký stupeň	0-10
	b) stredný stupeň	20
	c) ťažký stupeň	30
24. Poúrazové aseptické nekrózy zápästných kostí (aktívne štádium dva roky)		
25. Nervové poškodenie hornej končatiny		

	a) plexus brachialis		
		1. poškodenie hornej časti	20-40
		2. poškodenie dolnej časti (pri dominantnej končatine + 10 %)	30-50
	b) nervus axillaris		30
	c) nervus radialis		20-30
	d) nervus ulnaris		20-30
	e) nervus medianus		
		1. poškodenie hornej časti	40
		2. poškodenie dolnej časti	30
	f) nervus radialis a nervus axillaris		40-50
	g) nervus radialis a nervus ulnaris		40-50
	h) nervus radialis a nervus medianus		40-50
	i) nervus ulnaris a nervus medianus		40-50
	j) nervus radialis, nervus ulnaris a nervus medianus v oblasti predlaktia (pri dominantnej končatine + 10 %)		40-60

B.2. Dolné končatiny

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata oboch dolných končatín v stehne		100
2. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa		80-90
3. Úplná strata jednej dolnej končatiny a jednej hornej končatiny		100
4. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom		70-80
5. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb		50-60
6. Strata jednej dolnej končatiny v predkolení s dostatočnou funkciou kýpťa a kĺbu		40
7. Strata oboch dolných končatín v predkolení		
	a) dobrá funkčnosť amputačných kýpťov	60
	b) oslabená funkčnosť amputačných kýpťov	70
8. Strata nohy v členkovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa		
	a) jednostranná	20-30
	b) obojstranná	40-50
9. Strata nohy v Chopartovom kĺbe s dobrou alebo s oslabenou funkciou amputačného kýpťa		
	a) jednostranná s dobrým kýpťom	20-30
	b) obojstranná	30-40
10. Strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo v oblasti metatarzov s dobrou alebo oslabenou funkciou amputačného kýpťa		
	a) jednostranná s dobrým kýpťom	10-20
	b) obojstranná	30-40
11. Strata všetkých prstov na jednej nohe		20

12. Strata všetkých prstov na oboch nohách		30
13. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov		
	a) v priaznivom postavení	60
	b) v nepriaznivom postavení	70-80
14. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu		
	a) v priaznivom postavení	30
	b) v nepriaznivom postavení	60-70
15. Obmedzenie pohyblivosti bedrových kĺbov		
	a) ľahký stupeň (vystretie/ ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0° - 10° - 90°)	
	aa) jednostranne	0-10
	ab) obojstranne	10-20
	b) stredný stupeň (vystretie/ ohnutie s primeranou rotáciou, prinožením, unožením 0° - 30° - 90°)	
	ba) jednostranné	20-30
	bb) obojstranné	30-40
	c) ťažký stupeň	
	1. jednostranné	30-40
	2. obojstranné	40-50
16. Vrodená luxácia bedrových kĺbov počas liečby podľa stupňa kĺbovej chyby (subluxácia-luxácia) a náročnosti použitej liečby		30-60
17. Stav po operácii bedrového kĺbu s reziduálnou poruchou funkcie		
	a) ľahký stupeň	10-20
	b) stredný stupeň	20-30
	c) ťažký stupeň (pri obojstrannom postihnutí + 10 %)	40-50
18. Stav po vykonanej endoprotéze bedrového kĺbu alebo kolenného kĺbu		
	a) jednostranná	20
	b) obojstranná	50
19. Pseudoartróza krčka stehennej kosti		
	a) stabilná	30
	b) instabilná	50
20. Pseudoartróza stehennej kosti		
	a) stabilná	30
	b) instabilná	50
21. Skrútenie dolnej končatiny		
	a) od 4 cm do 6 cm	20
	b) nad 6 cm	30
	c) nad 10 cm	40-50
22. Aseptická nekróza		
	Perthesova choroba v aktívnom štádiu počas liečenia (v rozsahu do dvoch rokov)	70-100
23. Stuhnutie jedného kolenného kĺbu		

	a) v priaznivom postavení (ohnutie o 5°-10°)	20-30
	b) v nepriaznivom postavení	40-50
24. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov		
	a) v priaznivom postavení	50
	b) v nepriaznivom postavení	60
25. Uvolnenie väzivového aparátu kolena, luxácie		
26. Stav po zlomenine jabĺčka		
	a) bez dislokácie úlomkov s opakovanou liečbou	10
	b) s dislokáciou úlomkov	20-30
27. Obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (vystretie/ohnutie)		
	a) ľahký stupeň (vystretie/ohnutie 0° - 0° - 90°)	
	aa) jednostranne	0-10
	ab) obojstranne	10-20
	b) stredný stupeň (vystretie/ohnutie 0° - 10° - 90°)	
	ba) jednostranne	20-30
	bb) obojstranne	30-40
	c) ťažký stupeň (vystretie/ohnutie 0° - 30° - 90°)	
	ca) jednostranne	30-40
	cb) obojstranne	40-50
28. Pseudoartróza kostí predkolenia		
	a) stabilná	20-30
	b) instabilná	40-50
29. Stuhnutie horného členkového kĺbu		
	a) v priaznivom postavení (plantárna flexia od 5 do 15 stupňov)	20
	b) v nepriaznivom postavení (plantárna flexia nad 15 stupňov)	30
30. Stuhnutie dolného členkového kĺbu (v strednom postavení)		
31 . Stuhnutie horného členkového kĺbu aj dolného členkového kĺbu		
	a) v priaznivom postavení	30
	b) v nepriaznivom postavení	40
32. Obmedzenie funkcie členkového kĺbu (vystretie/ohnutie, vbočenie chodidla)		
	a) ľahký stupeň	0-10
	b) stredný stupeň (0° - 0° - 30°)	10-20
	c) ťažký stupeň	20-30
33. Pes equinovarus vrodený (stupeň funkčnej poruchy závisí od rozsahu deformity nohy, frekvencie a intezity bolesti, od schopnosti či neschopnosti stáť a chodiť bez ortopedických topánok)		
	a) jednostranný	20-40
	b) obojstranný	30-60
34. Ostatné deformity nohy s poruchou statiky a dynamiky nohy pri stoji a pri chôdzi stredného a ťažšieho stupňa podľa závislosti od trvalého nosenia ortopedických topánok a potreby liečby bolesti nohy		
35. Nervové výpady dolných končatín		

	a) plexus lumbosacralis	80
	b) nervus superior	20
	c) nervus inferior	20
	d) nervus femoralis	40
	e) nervus cutaneus femoralis	10
	f) nervus ischiadicus	
		1. proximálna časť
		2. distálna časť
	g) nervus peroneus communis (nervus fibularis)	
		1. profundus
		2. superficialis
	h) nervus tibialis	30
36. Úplná afunkčnosť jednej dolnej končatiny		80

Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty dolnej končatiny (anatomická alebo funkčná) a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami. Pri nervových postihnutiach dolnej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad. Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitivne nervové výpady sa neposudzujú.

Miera funkčnej poruchy sa určí v závislosti od rozsahu funkčných porúch, rtg. zmien v zmysle degeneratívnych zmien a dosiaľ vykonanej liečby.

Miera funkčnej poruchy sa určí podľa následkov zdravotného postihnutia straty hornej končatiny (anatomická alebo funkčná) s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a bez ohľadu na kompenzáciu týchto následkov ortopedickými pomôckami.

Pri strate všetkých desiatich prstov sa posudzuje strata celých prstov; neposudzuje sa strata jednotlivých článkov prstov.

Pri nervových postihnutiach hornej končatiny sa posudzuje úplný nervový výpad pri intenzívnej liečbe (jeden rok). Čiastočný nervový výpad sa určuje polovicou príslušnej miery funkčnej poruchy. Izolované senzitivne nervové výpady sa neposudzujú.

XIII. Močové ústrojenstvo

A. Postihnutie obličiek

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata alebo výpad funkcie obličky pri zdravej druhej obličke		10-20
2. Vývojová anomália obličiek bez podstatných ťažkostí a bez funkčného obmedzenia		0-10
3. Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia		
	a) s kolikami s odstupom niekoľkých mesiacov	0-10
	b) s častejšími kolikami a ťažkosťami	10-20
4. Postihnutie obličiek s obmedzením funkcie (bez ohľadu na etiológiu)		
	aj ľahkeho stupňa (obličkové lunkcie sú trvale znížené s miernym obmedzením výkonnosti)	20-40
	b) stredného stupňa (obličkové funkcie sú značne znížené so značným obmedzením výkonnosti)	40-60
	c) ťažkého stupňa (sú prítomné laboratórne známky chronickej obličkovej insuficiencie s podstatným obmedzením výkonnosti)	60-80
5. Strata alebo výpad jednej obličky s funkčným obmedzením druhej obličky		
	a) ľahkého stupňa	
	1. bez progresie	20-30
	2. s progresiou	30-40
	b) stredného stupňa	40-60
	c) ťažkého stupňa	60-80
6. Postihnutie obličiek liečených umelou obličkou (dialýzou) s ohľadom na prítomné komplikácie		60-80
7. Transplantácia obličky		
	a) stav po transplantácii obličky do dvoch rokov	80-100
	b) stav po transplantácii obličky s dobrou funkciou štepu po dvoch rokoch	50-60
8. Malígnny tumor obličky		
	a) po odstránení vo včasnom štádiu (T1 NOMO)	40-50
	b) po odstránení v iných štádiách	70-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100

B. Ochorenie močových ciest

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Chronický zápal močových ciest		
	a) ľahšieho stupňa (bez podstatnej poruchy mikcie)	0-10
	b) ťažšieho stupňa (so značnými poruchami mikcie)	10-20
2. Poruchy vyprázdňovania močového mechúra		
	a) ľahšieho stupňa (pri nepatrnej retencii moču, nočné odkvapkávanie moču)	10
	b) ťažšieho stupňa (potrebné manuálne vyprázdňovanie, použitie močového stimulátora, značná retencia moču (nad 100 ml), bolestivé močenie)	20-30
	c) s potrebou pravidelného cievkovania, trvalé nosenie cievky, urinálu, bez podstatných sprievodných prejavov	40-50
3. Malígný tumor močového mechúra (povrchový a infiltratívny)		
	a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)	40-60
	b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
4. Inkontinencia moču		
	a) relatívna inkontinencia moču	
		1. stresová I. stupňa
		2. stresová II. stupňa
		3. stresová III. stupňa
	b) úplná inkontinencia moču	50-70
5. Zvráskavený mechúr so značným zmenšením kapacity		20-40
6. Močovo-kožná píšťala prednej močovej trubice pri inkontinencii moču		20
7. Močovo-črevná píšťala pri análnej inkontinencii		40-60
8. Obličkovo-kožná píšťala, močovo-kožná píšťala a mechúrovo-kožná píšťala so značnou sekréciou		60-70
9. Umelý vývod moču navonok		60-80
10. Funkčne málo významné anomálie močovo-pohlavného systému		10-20
11. Anomálie so stredne ťažkým postihnutím až ťažkým postihnutím funkcie a telesnej výkonnosti		40-60
12. Vrodené chyby močovo-pohlavného systému s anomálnym vyústením, rázštepové chyby u detí		40-60

Stupeň postihnutia sa určí podľa rozsahu funkčnej poruchy do obdobia rekonštrukčného riešenia.

Miera funkčnej poruchy zdravotného postihnutia močového ústrojenstva sa určí poruchou produkcie moču (overí sa najmä funkčným vyšetrením, lekárskymi nálezmi, urodynamickým vyšetrením, endoskopicky). Treba brať do úvahy aj zdravotné postihnutie iných orgánov (najmä srdca a obehu), aktivitu zápalového procesu, účinky na celkový stav

a potrebu obmedzenia spôsobu života. Miera funkčnej poruchy pri zdravotných postihnutiach uvedených v písmene B bode šesť až dvanásť sa určuje len do obdobia rekonštrukčného riešenia.

XIV. Pohlavné orgány

A. Mužské pohlavné orgány

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1 . Strata penisu		40-50
2. Čiastočná strata penisu		20-40
3. Malígný tumor penisu		
	a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)	40-50
	b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
4. Strata oboch semenníkov alebo úplná atrofia oboch semenníkov		
	a) pred skončením telesného vývoja	20-40
	b) v produktívnom veku	20-30
	c) vo vyššom veku	10
5. Malígný tumor semenníka		
	a) po odstránení lokalizovaného seminómu alebo lokalizovaného malígneho teratómu bez postihnutia lymfatických uzlín (T1 NOMO)	40-50
	b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	70-80
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
6. Chronické zápal prostaty s trvalými značnými poruchami mikcie		10-20
7. Adenóm prostaty bez porúch mikcie alebo s ľahkou poruchou		0-10
8. Malígný tumor prostaty		
	a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1-2 NOMO)	40-50
	b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
9. Malígný tumor prsnej žľazy		
	a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)	40-60
	b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
10. Vrodené chyby pohlavných orgánov		40-60

B. Ženské pohlavné orgány

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Strata prsníka nenádorovej etiológie (vo fertílno m veku)		
	a) jednostranná	30
	b) obojstranná	50
2. Strata atrofického prsníka po menopauze		
	a) jednostranná	10-20
	b) obojstranná	20-30
3. Hypertrofia prsníkov (pubertálna forma, mastoptóza)		10-20
4. Malígn y tumor prsnej žlázy		
	a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)	40-60
	b) po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
5. Strata maternice alebo sterilita vo fertílno m veku (treba prihliadať na psychoreaktívne poruchy)		10-20
6.	Malígn y tumor krčka maternice a tela maternice (s výnimkou carcinoma in situ)	
	a) po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO)	40-50
	b) po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
7.	Strata oboch vaječníkov bez výrazného patologického účinku na hormonálny systém	0-10
8.	Strata oboch vaječníkov vo fertílno m veku alebo pri nedostatočnej možnosti substitúcie pri vyrovnaní hormonálneho deficitu	20-30
9.	Malígn y tumor vaječníka	
	a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)	40-50
	b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100
10.	Chronický alebo často sa opakujúci zápal vaječníkov, závesného aparátu maternice alebo maternice	
	a) ľahkého stupňa	0-10
	b) stredného stupňa	10-20
	c) ťažkého stupňa (recidívy viackrát v roku)	20-30

11.	Endometrióza ťažkého stupňa	20-30
12.	Vaginálne píšťaly	
	a) píšťala močová cesta - pošva	40-60
	b) píšťala konečník - pošva	40-60
	c) píšťala močová cesta - konečník - pošva	80-90
	d) filiformné píšťaly	20-30
13.	Pokles pošvovej steny alebo maternice	
	a) bez močovej inkontinencie alebo s nepatrnou stresovou inkontinenciou moču (I. stupeň)	0-10
	b) so silnejšou inkontinenciou moču	20-40
	c) s úplnou inkontinenciou moču	50-60
14.	Vrodené chyby pohlavných orgánov	40-60
15.	Craurosis vulvae	
	a) ľahkého stupňa bez ťažkostí alebo s minimálnymi ťažkosťami	0-10
	b) ťažšieho stupňa so značnými ťažkosťami, sekundárne zmeny (vredy, ekzémy, jazvy)	20-40
16.	Malígný tumor pošvy a vonkajších rodidiel (s výnimkou carcinoma in situ)	
	a) po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 NOMO)	40-50
	b) v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby	80-90
	c) po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla do piatich rokov)	40-50
	d) neliečiteľné formy	90-100

Miera funkčnej poruchy zdravotných postihnutí sa určí na základe klinického obrazu v urologickej, sexuálnej a onkologickej oblasti. Pri zdravotných postihnutiach ženských pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí na základe gynekologického, endokrinologického a onkologického vyšetrenia s prihliadnutím na vek ženy. Pri vrodených poruchách pohlavných orgánov sa miera funkčnej poruchy určí len do obdobia rekonštrukčného riešenia.

XV. Hlava a tvár

Druh zdravotného postihnutia		Miera funkčnej poruchy v %
1. Stav po traume (úraze) hlavy a mozgu s vnútrolebkovým krvácaním, s trvalými poruchami v neurologickej, psychiatrickej, psychologickej a zmyslovej oblasti		
	a) poruchy ľahkého stupňa	20-30
	b) poruchy stredného stupňa	40-60
	c) poruchy ťažkého stupňa	70-100
2. Stav po zlomeninách lebky bez neurologických príznakov, stav po otrase mozgu		5-10
3. Zohyďujúce znetvorenie tváre, ťažké deformity kostných a mäkkých častí ovplyvňujúcich mimiku, artikuláciu, žuvanie a pod.		30-60

Miera funkčnej poruchy uvedených zdravotných postihnutí sa určí podľa klinickej symptomatológie v neurologickej, stomatologickej, oftalmologickej a estetickej oblasti.

**Príloha č. 2
k zákonu č. 450/2000 Z. z.**

PRÍLOHA č. 7

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu, garáže	Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom ³⁶⁾						
	do 2	do 3	do 4	do 5	do 6	do 7	
do 10 000 Sk	90 %	90 %	70 %	50 %	30 %	20 %	Výška príspevku v % z ceny pomôcky, z ceny úpravy bytu, rodinného domu najviac zo sumy 500 000 Sk, z ceny úpravy garáže najviac zo sumy 100 000 Sk
do 50 000 Sk	95 %	85 %	75 %	65 %	55 %	45 %	
nad 50 000 Sk	95 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	

**Príloha č. 3
k zákonu č. 450/2000 Z. z.**

PRÍLOHA č. 9

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla

Cena osobného motorového vozidla	Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom ³⁶⁾						
	do 2	do 3	do 4	do 5	do 6	do 7	
Š	85 %	80 %	70 %	55 %	45 %	35 %	Výška príspevku v % z ceny osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 400 000 Sk

